

Тест T-SPOT.TB (анализ крови на туберкулез)

T-SPOT.TB – это способ определения наличия туберкулезной инфекции в организме. Точность результата – около 98%. Его проводят по показаниям в дополнение к другим методам обследования.

Нет ограничений на выполнения теста: его можно делать даже маленьким детям, при аллергических заболеваниях, некоторых болезнях кожи, при обострении хронических заболеваний, при острых инфекционных заболеваниях. Тест T-SPOT.TB безопасен и не имеет побочных реакций. Вакцинация БЦЖ абсолютно никак не влияет на результаты теста T-SPOT. Тест разрешен к применению в РФ и должен быть занесен в медкарту ребенка.

Когда врач может назначить T-СПОТ ребенку?

- если есть аллергическое заболевание (например, бронхиальная астма)
- при кожных болезнях (атопический дерматит, крапивница, псориаз)
- при эпилепсии
- при хронических болезнях: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, сахарный диабет и т.д.
- при карантине по инфекционным заболеваниям в саду или школе (кожные пробы можно проводить только через 1 месяц после карантина)
- если отмечалась аллергия на туберкулин
- при контакте с человеком, у которого обнаружен туберкулез
- при положительной пробе Манту (для проверки результата)
- если есть подозрение на внелегочную форму туберкулеза.

Наличие одного отрицательного результата T-SPOT.TB не является основанием для исключения туберкулеза.