

## Кожная проба с препаратом «Диаскинтест»

До 95% взрослых людей инфицированы палочкой Коха, т.е. носители. Это не является заболеванием, однако при определенных условиях туберкулез может развиваться, что случается у менее чем 1% людей. Следует иметь в виду, что процесс долгое время протекает скрытно и бессимптомно. Выявить заболевание по внешним признакам без постановки специальных проб не представляется возможным. Ранняя диагностика туберкулезного процесса существенно увеличивает шансы на выздоровление.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2017 №124н «Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических осмотров граждан в целях выявления туберкулеза» утверждает применение для диагностики туберкулеза не только пробы Манту и флюорографии, но и диаскинтеста. Детям до 7 лет будет делаться проба Манту, для диагностики туберкулеза у детей с 8 до 17 лет (включительно) будет применяться диаскинтест.

При решении вопроса о том, как часто можно делать диаскинтест ребенку или взрослому, руководствуются следующим:

- после проведения любой вакцинации – через 1 месяц;
- после перенесенных острых инфекционных заболеваний – через 1 месяц.

Более подробно о противопоказаниях пациенту сообщит врач.

Тем, кто состоит на учете у фтизиатра в противотуберкулезном диспансере, контрольную пробу ставят с частотой 1 раз в 3-6 месяцев.

Диаскинтест можно делать с возраста 1 год при получении положительной реакции на пробу Манту.

Тестирование делают одновременно с пробой Манту только по назначению фтизиатра.

Необходимое условие – отсутствие любых инфекционных заболеваний в течение месяца до и на момент постановки пробы и отсутствия контакта инфекционными заболеваниями (карантин).



Диаскинтест содержит генно-модифицированные антигены патогенных микобактерий, которые отсутствуют в туберкулезной вакцине БЦЖ. Это основное отличие от пробы Манту.

Однако, в отдельных случаях могут иметь место как ложноположительные, так и ложноотрицательные результаты теста.

Тест высокочувствительный, позволяет дифференцировать заражение человека патогенными бактериями туберкулеза от непатогенных. Высокая степень чувствительности

теста позволяет контролировать эффективность лечения.

Данный препарат применяется только по назначению и после осмотра врача перед тестом.